

CARLA DI MARCO, GIUSEPPE OSELLA &
ANNA MARIA ZUPPA(*)

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEI COLEOPTERA
CURCULIONOIDEA DELLE PICCOLE ISOLE ITALIANE CON
DESCRIZIONE DI *OTIORHYNCHUS* (*ARAMMICHNUS*)
POGGII N. SP. DELL'ISOLA DI LAMPIONE
(SICILIA, PELAGIE)

(IV CONTRIBUTO)⁽¹⁾

PREMESSA

I Coleoptera Curculionoidea raccolti dal dr. Roberto Poggi nell'Isola di Lampione (Sicilia, Pelagie) durante le campagne naturalistiche nelle isole del Canale di Sicilia, svolte nel 1996 con la nave della Marina Militare "Paolucci", ci permettono di descrivere come nuova specie l' *Otiorhynchus* (*Arammichnus*) sp. già individuato da OSELLA & RITI (1995) e ritenuto inedito sulla base dell'unica femmina allora disponibile. Con questo contributo arricchiamo, inoltre, di ulteriori dati il quadro delle nostre conoscenze faunistiche per le piccole isole parasarde e del canale di Sicilia.

***Otiorhynchus* (*Arammichnus*) *poggii* n. sp.**

Loc. tip.: Isola Lampione (Pelagie)

Otiorhynchus (*Arammichnus*) sp. (n. sp.?) OSELLA & RITI, 1995

Materiale esaminato. Sicilia, Pelagie, Isola Lampione (AG), 24.IX.1996, 14 ♂♂ (+ 5 addomi) (Holotypus e Paratypi), 11 ♀♀ (+ 4 addomi) (Paratypi), 1 elitra, R. Poggi leg.; idem, 1 ♀ (Paratypus), VIII.1980, leg. A. Alberti; idem, 24.IX.1996, 1

(*) C. Di Marco, G. Osella & A. M. Zuppa, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli studi dell'Aquila, Via Vetoio, loc. Coppito, 67100 L'Aquila (Italia)

⁽¹⁾ La numerazione non elenca i contributi parziali e le descrizioni di nuove specie di *Trachyphloeus* Germar, 1817 che uno di noi (Osella) ha pubblicato con Roman Borovec. Pertanto i lavori antecedenti al presente sono: GREGORI & OSELLA (1989); OSELLA & RITI (1995); OSELLA & ZUPPA (1995).

addome ♀ (Paratypus), E. De Matthaeis leg.; idem, 24.IX.1996, 2 ♂♂ (+ 1 addome ♀) (Paratypi), R. Argano leg.

H o l o t y p u s ♂, 12 Paratypi ♂♂, 7 Paratypi ♀♀ (+ 10 addomi e 1 elitra) nelle collezioni del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" (Genova); 3 Paratypi ♂♂, 4 Paratypi ♀♀ in collezione G. Osella, L'Aquila.

D i a g n o s i . *Otiorhynchus (Arammichnus) poggii* n. sp., a motivo delle areole del disco del pronoto ombelicate, della pubescenza aderente o appena sollevata sulle elitre e della distanza interoculare pari al diametro oculare o appena maggiore, appartiene al gruppo di *O. cribricollis* Gyllenhal, 1834 sensu MAGNANO (1992). A motivo, poi, delle interstrie con setoline seriate ed aderenti al tegumento e delle squamule elitrali disposte a gruppi nella regione posteriore delle elitre, nonché per l'anfigonia, la n.sp. si avvicina ad *O. moriger* Reitter, 1913 (Malta) ma soprattutto, per la forma generale dello spiculum ventrale (Figg. 4, 5, 6), ad *O. reticollis* Boheman, 1843 (Sicilia). Da quest'ultimo si differenzia per le dimensioni medie maggiori, per la distanza interoculare media minore, per gli occhi piccoli, subsferici ed eccentricamente prominenti (più grandi, subovali e piatti in *O. reticollis*), per le areole del disco del pronoto piccole, superficiali e separate le une dalle altre da un intervallo pari o maggiore al diametro delle areole stesse (un poco più grandi, meno superficiali e separate da un intervallo pari al loro diametro in *O. reticollis*), per il rapporto medio tra la larghezza e la lunghezza del pronoto maggiore, per il rapporto medio tra la lunghezza e la larghezza delle elitre minore, per le strie superficiali con punteggiatura piccola e poco profonda (marcate con punteggiatura molto più grande e profonda in *O. reticollis*), per le interstrie 1,5 volte più larghe delle strie (della stessa larghezza in *O. reticollis*) con granuli appena accennati (più evidenti in *O. reticollis*) e per le setole delle interstrie brevi, sottili (più lunghe, robuste in *O. reticollis*).

O. poggii n.sp. si differenzia, invece, da *O. moriger*, oltre che per le dimensioni medie maggiori, per il rapporto medio tra la lunghezza e la larghezza del rostro maggiore, per la distanza interoculare media leggermente minore, per gli occhi subsferici ed eccentricamente prominenti (subovali e piatti in *O. moriger*), per le areole del disco del pronoto piccole, superficiali e separate le une dalle altre da un intervallo pari o maggiore al diametro delle areole stesse (più grandi, profonde e separate le une dalle altre da un intervallo pari solo ad 1/3 del loro diametro in *O. moriger*), per il rapporto medio tra la larghezza e la lunghezza del pronoto maggiore, per il rapporto medio tra la lunghezza e la larghezza delle elitre leggermente inferiore, per le strie superficiali

con punteggiatura piccola e poco profonda (marcate e con punteggiatura più grande e profonda in *O. moriger*), per le interstrie 1,5 volte più larghe delle strie (della stessa larghezza delle strie in *O. moriger*), per i granuli delle interstrie appena accennati (un poco più accentuati in *O. moriger*) e per le setole delle interstrie brevi, sottili (più lunghe, robuste in *O. moriger*).

L'edeago presenta in media dimensioni maggiori rispetto sia a quello di *O. reticollis* sia a quello di *O. moriger* con apodemi 1,5 volte più lunghi del lobo mediano (di lunghezza di poco superiore in *O. reticollis* e doppia in *O. moriger*) con apice estremo arrotondato (subquadrato in *O. reticollis*, maggiormente arrotondato in *O. moriger*) (Figg. 1-3). Spiculum ventrale a margine esterno arcuato ed ampio (più arcuato e meno ampio in *O. reticollis*, arcuato ma meno largamente in *O. moriger*) con margine basale delle lamine più angolato (meno angolato in *O. reticollis*, arrotondato in *O. moriger*), fenestra piccola come in *O. reticollis* (più grande in *O. moriger*) (Figg. 4,5, 6 e Tabella I)⁽²⁾.

Minori sono invece le affinità con altre specie del gruppo (*O. hyblaeicus* Magnano, 1992, di Sicilia e *O. cribricollis* Gyllenhal, 1834) dalle quali la nuova specie si differenzia, oltre che per l'anfigonia, per i caratteri riportati nella Tabella I. Spicula, spermateche e ovopositori come in Figg. 7-8.

Descrizione dell'holotipus ♂. Colore del corpo castano scuro. Rostro più lungo che largo (scrobe comprese) a margini laterali leggermente convergenti all'indietro; solco mediano appena accennato, punteggiato medialmente, liscio invece tra gli occhi. Spazio interoculare largo quanto il diametro oculare, con fossetta frontale evidente. Distanza interoculare minore della metà della larghezza del rostro all'altezza delle scrobe. Queste ultime, chiuse anteriormente, lisce, evidenti e brillanti, raggiungono all'indietro gli occhi. Antenne snelle con scapo allungato, cilindrico, lievemente ingrossato all'apice, che raggiunge, posteriormente, la parte mediana del pronoto. I rapporti tra gli articoli del funicolo sono i seguenti: 21:17:10:9.8:8:8. Clava fusiforme con setoline brevi e aderenti che le conferiscono un aspetto vellutato e con sporadiche setole più lunghe. Occhi subsferici eccentricamente prominenti. Protorace leggermente trasverso con areole discali di media grandezza, superficiali, separate da spazi fine-

⁽²⁾ Per la descrizione delle armature genitali la nomenclatura seguita è quella di O'BRIEN & ASKEVOLD (1992) e PIEROTTI & BELLÒ (2000).

mente punteggiati di larghezza uguale o maggiore al diametro delle areole stesse. Queste ultime ai lati del pronoto sono più numerose, profonde e ordinate in file più o meno regolari. In ciascuna areola, poi, è inserita una setola lunga circa 0,116 mm. Scutello piccolo ma ben visibile. Elitre fortemente convesse, arcuate ai lati; strie superficiali con punteggiatura areolare provvista di setoline sul margine superiore; dette setoline sono meno lunghe della metà del diametro delle areole (0,116 mm circa). Interstrie 1,5 volte più larghe delle strie con granuli appiattiti anteriormente e più rilevati posteriormente, recanti setole abbattute, seriate, piuttosto corte (0,104 mm). Nella parte distale delle elitre sono presenti, in gruppi isolati, piccole squame. Zampe moderatamente robuste, con femori setolosi debolmente clavati, tibie subrettilinee, anch'esse setolose. Tarsi con articoli 1° e 2° più lunghi che larghi, conici, 3° fortemente bilobo, setoloso inferiormente; onichio allungato (0,651 mm).

Edeago allungato (3,648 mm); lobo mediano a lamina ventrale sclerificata e con canale dorsale esteso dalla base all'apice, in visione ventrale presenta lati subparalleli; apice estremo non allungato, largamente ed uniformemente arrotondato; in visione laterale robusto, uniformemente e moderatamente curvato. Apodemi robusti, di larghezza più o meno uniforme, lunghi circa 1,5 volte la lunghezza del lobo mediano. Sacco interno con distinti scleriti nell'orifizio apicale. Edeago e spiculum ventrale: Fig. 3.

Misure dell'holotypus ♂: lunghezza del rostro dal margine superiore degli occhi = 1,250 mm; larghezza del rostro incluse le scrobe = 1,125 mm; larghezza del rostro escluse le scrobe = 0,875 mm; larghezza del rostro sotto le scrobe = 0,750 mm; larghezza della fronte inclusi gli occhi = 1,125 mm; lunghezza del capo = 0,125 mm; distanza interoculare = 0,375 mm; lunghezza del pronoto = 2,187 mm; larghezza massima del pronoto = 2,250 mm; larghezza del margine anteriore del pronoto = 1,500 mm; lunghezza delle elitre = 5,437 mm; larghezza massima delle elitre = 3,937 mm; larghezza della base delle elitre = 2,062 mm; lunghezza totale (rostro compreso) = 8,875; rapporto tra la larghezza e la lunghezza del pronoto = 1,028 mm; rapporto tra la lunghezza e la larghezza delle elitre = 1,380; lunghezza delle tibie anteriori = 2,187 mm; lunghezza delle tibie posteriori = 2,312 mm; lunghezza dello scapo = 2,625 mm; lunghezza del funicolo = 2,531 mm; lunghezza della clava = 0,718 mm; lunghezza degli articoli del funicolo: 1° = 0,656 mm; 2° = 0,531 mm; 3° = 0,312 mm; 4° = 0,281 mm; 5°; 6°; 7° = 0,250 mm.

Descrizione dei paratypi. Le ♀♀ si distinguono dai ♂♂ per le dimensioni del corpo leggermente inferiori, per il rapporto medio tra lunghezza e larghezza del rostro (incluse le scrobe) maggiore (1,065 nelle femmine, 0,969 nei maschi), per la distanza interoculare maggiore, per il rapporto inferiore tra la lunghezza e la larghezza delle




Fig. 1-3: Spicula ed edeagi in visione dorsale e laterale di: 1) *Otiorhynchus moriger* Malta, Isola di Comino, St. Marija, 26.IX.1977, J. Schembri leg.; 2) *O. reticollis*, Sicilia, Siracusa (SR), Melilli, 25.VI.1991, C. Bellò leg.; 3) *O. poggii* n.sp., Sicilia (Pelagie) (AG), Isola di Lampione, 24.IX.1996, R. Poggi leg. (Scala: 1 mm).

elitre, per la minore lunghezza delle tibie anteriori e delle posteriori, nonché dello scapo, del funicolo e della clava. I rapporti tra gli articoli antennali nei ♂♂ sono i seguenti: 12:11:7:6:5:5:5 (Min); 21:17:10:9:8:8:8 (Max); nelle ♀♀ sono invece: 12:9:6:6:4:4:4 (Min); 18:12:8:7:6:6:6 (Max). Alcuni esemplari si presentano privi di setole e squamule sulle elitre (probabilmente per abrasione).

Armatura genitale femminile con VIII sternite provvisto apicalmente di numerose setole, robuste, lunghe e coniche; margine esterno dello spiculum ventrale fortemente arcuato; lamine largamente fuse, con una piccola fenestra ovale. Apodemi contigui alla base e leggermente divergenti nel 1/3 basale. Spiculum ventrale, spermateca ed ovopositore come in Fig. 4.

Dati morfometrici di 15 esemplari ♂♂ e di 5 addomi: lunghezza del rostro dal margine superiore degli occhi = 0,937 mm $\pm$ 0,154 (0,687 Min-1,250 Max); larghezza del rostro incluse le scrobe = 0,964 mm $\pm$ 0,094 (0,812-1,125); larghezza del rostro escluse le scrobe = 0,742 mm $\pm$ 0,067 (0,625-0,875); larghezza del rostro sotto le scrobe = 0,679 mm $\pm$ 0,055 (0,562-0,750); larghezza della fronte inclusi gli occhi = 0,980 mm $\pm$ 0,081 (0,812-1,125); lunghezza del capo = 0,164 mm $\pm$ 0,057 (0,125-0,312); distanza interoculare = 0,328 mm $\pm$ 0,048 (0,250-0,375); lunghezza del pronoto = 1,757 mm $\pm$ 0,178 (1,437-2,187); larghezza massima del pronoto = 1,949 mm $\pm$ 0,181 (1,562-2,312); larghezza del margine anteriore del pronoto = 1,214 mm $\pm$ 0,116 (1,062-1,500); lunghezza delle elitre = 4,559 mm $\pm$ 0,450 (3,500-5,437); larghezza massima delle elitre = 3,398 mm $\pm$ 0,305 (2,875-3,937); larghezza della base delle elitre = 1,752 mm $\pm$ 0,170 (1,437-2,062); lunghezza totale (rosto compreso) = 7,484 mm $\pm$ 0,840 (5,875-8,875); rapporto tra la larghezza e la lunghezza del pronoto = 1,110 $\pm$ 0,059 (1,028-1,233); rapporto tra la lunghezza e la larghezza delle elitre = 1,340 $\pm$ 0,046 (1,191-1,392); lunghezza delle tibie anteriori = 1,785 mm $\pm$ 0,194 (1,437-2,187); lunghezza delle tibie posteriori = 1,898 mm $\pm$ 0,196 (1,562-2,312); lunghezza dello scapo = 2,064 mm $\pm$ 0,234 (1,718-2,625); lunghezza del funicolo = 2,023 mm $\pm$ 0,248 (1,593-2,531); lunghezza della clava = 0,605 mm $\pm$ 0,056 (0,468-0,718); lunghezza degli articoli del funicolo: 1° = 0,513 mm $\pm$ 0,075 (0,375-0,656); 2° = 0,433 mm $\pm$ 0,060 (0,343-0,531); 3° = 0,269 mm $\pm$ 0,027 (0,218-0,312); 4° = 0,226 mm $\pm$ 0,026 (0,187-0,281); 5°; 6°; 7° = 0,193 mm $\pm$ 0,026 (0,156-0,250).

Dati morfometrici di 11 paratypi ♀♀ e di 6 addomi: lunghezza del rostro dal margine superiore degli occhi = 1,005 mm $\pm$ 0,116 (0,687 Min-1,125 Max); larghezza del rostro incluse le scrobe = 0,943 mm $\pm$ 0,071 (0,812-1,062); larghezza del rostro escluse le scrobe = 0,750 mm $\pm$ 0,062 (0,625-0,812); larghezza del rostro sotto le scrobe = 0,670 mm $\pm$ 0,056 (0,562-0,750); larghezza della fronte inclusi gli occhi = 1,005 mm $\pm$ 0,090 (0,875-1,187); lunghezza del capo = 0,159 mm $\pm$ 0,064 (0,062-0,312); distanza interoculare = 0,346 mm $\pm$ 0,051 (0,250-0,437); lunghezza del pronoto = 1,697 mm $\pm$ 0,152 (1,500-1,937); larghezza massima del pronoto = 1,958 mm $\pm$ 0,144 (1,687-2,187); larghezza del margine anteriore del pronoto = 1,250 mm $\pm$ 0,084 (1,125-1,375); lunghezza delle elitre = 4,709 mm $\pm$ 0,397 (3,750-5,312); larghezza massima delle elitre = 3,599 mm $\pm$ 0,323 (2,937-4,187); larghezza della base delle elitre = 1,852 mm $\pm$ 0,149 (1,562-2,125); lunghezza totale (rosto compreso) = 7,431 mm $\pm$ 0,625 (6,125-8,250); rapporto tra la larghezza e la lunghezza del pronoto =




Fig. 4-8: Spicula, spermateche e ovopositori di: 4) *Otiorhynchus poggii* n.sp., Sicilia (Pelagie) (AG), Isola di Lampione, 24.IX.1996, R. Poggi leg.; 5) *O. reticollis*, Sicilia, Siracusa (SR), Plemmisio, 10.XI.1968, V. Aliquò leg.; 6) *O. moriger*, Isola di Comino, St. Marija, 26.IX.1977, J. Schembri leg.; 7) *O. hyblaeicus*, Sicilia (SR), Melilli, 300 m, 20-25.VII.1969, L. Magnano leg.; 8) *O. cribricollis*, Sicilia (TP), Marsala, 24.V.1984, A. Mineo leg. (Scala: A = 1 mm (spermateca ed ovopositore); B = 0,25 mm (spiculum ventrale)).

TABELLA I

<i>O. poggii</i> n. sp.	<i>O. reticollis</i>	<i>O. moriger</i>	<i>O. hyblaeicus</i>	<i>O. cribricollis</i>
Specie anfigonica	Specie anfigonica	Specie anfigonica	Specie telitoca	Specie telitoca
Rapporto medio lunghezza/larghezza del rostro = 1,018	Rapporto medio lunghezza/larghezza del rostro = 1,019	Rapporto medio lunghezza/larghezza del rostro = 0,835	Rapporto medio lunghezza/larghezza del rostro = 0,906	Rapporto medio lunghezza/larghezza del rostro = 0,896
Occhi subsferici ed eccentricamente prominenti	Occhi subovali e appiattiti	Occhi subovali e appiattiti	Occhi subovali e appiattiti	Occhi subovali e molto appiattiti
Distanza interoculare media = 0,337 mm	Distanza interoculare media = 0,383 mm	Distanza interoculare media = 0,362 mm	Distanza interoculare media = 0,406 mm	Distanza interoculare media = 0,437 mm
Diametro oculare medio = 0,322 mm	Diametro oculare medio = 0,383 mm	Diametro oculare medio = 0,325 mm	Diametro oculare medio = 0,406 mm	Diametro oculare medio = 0,437 mm
Areole del disco del pronoto piccole, superficiali e separate tra di loro da un intervallo pari o maggiore al diametro dell'areola stessa	Areole del disco del pronoto poco più grandi, meno superficiali e separate tra di loro da un intervallo pari al diametro dell'areola stessa	Areole del disco del pronoto grandi, più profonde e separate tra di loro da un intervallo pari a 1/3 del diametro dell'areola stessa	Areole del disco del pronoto grandi, profonde e separate tra di loro da un intervallo pari alla metà del diametro dell'areola stessa	Areole del disco del pronoto grandi, profonde e separate tra di loro da un intervallo pari a 1/3 del diametro dell'areola stessa
Rapporto medio larghezza/lunghezza del pronoto = 1,132	Rapporto medio larghezza/lunghezza del pronoto = 1,090	Rapporto medio larghezza/lunghezza del pronoto = 1,107	Rapporto medio larghezza/lunghezza del pronoto = 1,145	Rapporto medio larghezza/lunghezza del pronoto = 1,120
Rapporto medio lunghezza/larghezza delle elitre = 1,324	Rapporto medio lunghezza/larghezza delle elitre = 1,423	Rapporto medio lunghezza/larghezza delle elitre = 1,364	Rapporto medio lunghezza/larghezza delle elitre = 1,390	Rapporto medio lunghezza/larghezza delle elitre = 1,458
Strie superficiali con punteggiatura piccola e poco profonda	Strie marcate con punteggiatura molto più grande e profonda	Strie marcate con punteggiatura più grande e profonda	Strie marcate con punteggiatura grande e profonda	Strie meno superficiali con punteggiatura poco più grande e profonda
Interstrie 1,5 volte più larghe delle strie	Interstrie della stessa larghezza delle strie	Interstrie della stessa larghezza delle strie	Interstrie della stessa larghezza delle strie	Interstrie della stessa larghezza delle strie
Granuli delle interstrie appena rilevati	Granuli delle interstrie molto più rilevati	Granuli delle interstrie un po' più rilevati	Granuli delle interstrie più rilevati	Granuli delle interstrie un po' più rilevati
Setole delle interstrie brevi e sottili	Setole delle interstrie lunghe e robuste	Setole delle interstrie più lunghe e robuste	Setole delle interstrie lunghe e robuste	Setole delle interstrie lunghe e robuste
Edeago di dimensioni medie maggiori	Edeago di dimensioni medie inferiori	Edeago di dimensioni medie inferiori	Specie telitoca	Specie telitoca
Apodemi 1,5 volte più lunghi del lobo mediano	Apodemi di lunghezza di poco superiore a quella del lobo mediano	Apodemi lunghi il doppio del lobo mediano	Specie telitoca	Specie telitoca
Apice estremo del lobo mediano arrotondato	Apice estremo del lobo mediano subquadrato	Apice estremo del lobo mediano più arrotondato	Specie telitoca	Specie telitoca
Margine esterno dello spiculum ventrale arcuato ed ampio	Margine esterno dello spiculum ventrale più arcuato e meno ampio	Margine esterno dello spiculum ventrale arcuato ma meno ampio	Margine esterno dello spiculum ventrale arcuato ma meno ampio	Margine esterno dello spiculum ventrale subtriangolare
Margine basale delle lamine angolato	Margine basale delle lamine meno angolato	Margine basale delle lamine arrotondato	Margine basale delle lamine arrotondato	Margine basale delle lamine arrotondato
Fenestra piccola	Fenestra piccola	Fenestra grande	Fenestra grande	Fenestra grande

1,155 $\pm$ 0,037 (1,100-1,208); rapporto tra la lunghezza e la larghezza delle elitre = 1,308 $\pm$ 0,026 (1,268-1,358); lunghezza delle tibie anteriori = 1,596 mm $\pm$ 0,173 (1,250-1,812); lunghezza delle tibie posteriori = 1,789 mm $\pm$ 0,172 (1,375-2,000); lunghezza dello scapo = 1,982 mm $\pm$ 0,165 (1,687-2,156); lunghezza del funicolo = 1,795 mm $\pm$ 0,181 (1,406-2,000); lunghezza della clava = 0,559 mm $\pm$ 0,060 (0,437-0,625); lunghezza degli articoli del funicolo: 1° = 0,485 mm $\pm$ 0,063 (0,375-0,562); 2° = 0,386 mm $\pm$ 0,046 (0,281-0,375); 3° = 0,221 mm $\pm$ 0,021 (0,187-0,250); 4° = 0,207 mm $\pm$ 0,015 (0,187-0,218); 5°; 6°; 7° = 0,164 mm $\pm$ 0,020 (0,125-0,187).

Note comparative. Riteniamo opportuno riassumere nella tabella I le differenze che maggiormente caratterizzano la nuova specie rispetto alle specie affini più sopra citate.

Derivatio nominis. Questa significativa ed interessante specie è dedicata al raccoglitore, l'amico dr. Roberto Poggi (Museo Civico di Storia Naturale di Genova) che, con grande cortesia, ci ha inviato in studio questo materiale.

Distribuzione geografica. Si tratta certamente di un endemismo dell'Isola di Lampedusa.

Note ecologiche. L'isola, di natura calcarea, è molto povera di vegetazione ed è caratterizzata soprattutto da *Atriplex* e *Lavatera*. Moltissimi esemplari morti della nuova specie sono stati rinvenuti sotto pietre. Gli esemplari vivi, invece, sono stati trovati ancora nelle loggette ninfali, sempre sotto pietre, insieme a Tenebrionidi (R. Poggi in verbis).

Note sistematiche. In base all'esame dell'allora unica ♀ disponibile la n. sp. venne provvisoriamente collocata da OSELLA & RITI (1995) nel gruppo *cribricollis* Gyll.-*striatosetosus* Boh. L'esame della serie qui analizzata ci ha permesso di precisare meglio le sue reali affinità.

TABELLA II

Nuovi dati relativi ai Coleoptera Curculionoidea delle isole del canale di Sicilia

(L'asterisco indica la prima segnalazione per l'isola)

Sicilia					
APIONIDAE					
<i>Nanomimus hemisphaericus</i> (Olivier, 1807)	Isola Favignana (TP), Stagno	11.IX.1996	1 ex	leg. R. Poggi	Museo di Genova
<i>Aspidapion aeneum</i> (Fabricius, 1775)	Isola Pantelleria (TP), Montagna Grande	17.IX.1996	3 exx	leg. R. Poggi	Museo di Genova
CURCULIONIDAE					
<i>Sitona gemellatus</i> (Gyllenhal, 1834)	Isola Pantelleria (TP), Montagna Grande	17.IX.1996	1 ex	leg. R. Poggi	Museo di Genova
<i>Larinus ursus</i> (Fabricius, 1792)	Isola Lampedusa (AG), Cala Madonna	23.IX.1996	1 ex	leg. N. Baccetti	Museo di Genova
<i>Donus crinitus</i> (Boheman, 1843)	Isola Favignana (TP), Stagno	14.IX.1996	*2 exx	leg. R. Poggi	Museo di Genova
<i>Anysorrhynchus costatus</i> Boheman, 1842	Isola Favignana (TP), Stagno	VI.1991	1 ex	leg. G. Osella	coll. G. Osella
<i>Torneuma</i> sp.	Isola Lampedusa (AG), Cala Madonna	VI.1991	*1 ex	leg. G. Osella	coll. G. Osella
<i>Amaurorhinus bewickianus</i> (Wollaston, 1860)	Isola Lampione (AG)	24.IX.1996	*1 ex	leg. R. Poggi	Museo di Genova
<i>Brachytemnus porcatus</i> (Germar, 1824)	Isola Pantelleria (TP), Montagna Grande	17.IX.1996	3 exx	leg. R. Poggi	Museo di Genova
<i>Tychius</i> sp.	Isola Favignana (TP), Stagno	14.IX.1996	*1 ex	leg. R. Poggi	Museo di Genova

TABELLA III

Nuovi dati relativi ai Coleoptera Curculionoidea delle isole parasarde

(L'asterisco indica la prima segnalazione per l'isola)

Sardegna					
APIONIDAE					
<i>Nanodiscus transversus</i> (Aubé, 1850)	Isola Caprera (SS), Stagnali	8.VI.1990	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Nanomimus hemisphaericus</i> (Olivier, 1807)	Isola Caprera (SS)	25.V.1992	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna

Segue TABELLA III

<i>Nanomimus hemisphaericus</i> (Olivier, 1807)	Isola Budelli (SS)	14.IV.1991	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Dieckmanniellus gracilis</i> (Redtenbacher, 1849)	Isola Budelli (SS)	14.IV.1991	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Dieckmanniellus gracilis</i> (Redtenbacher, 1849)	Isola Budelli (SS)	13.V.1992	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Dieckmanniellus gracilis</i> (Redtenbacher, 1849)	Isola Santa Maria (SS)	13.IV.1991	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Dieckmanniellus gracilis</i> (Redtenbacher, 1849)	Isola La Maddalena (SS)	27.V.1992	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Dieckmanniellus gracilis</i> (Redtenbacher, 1849)	Isola La Maddalena (SS)	9.V.1987	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Kalcapion semivittatum</i> (Gyllenhal, 1833)	Isola La Maddalena (SS)	13.III.1992	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Exapion subparallellum</i> (Desbrochers, 1888)	Isola Caprera (SS), Stagnali	5.VIII.1987	7 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Protapion apricans</i> (Herbst, 1797)	Isola La Maddalena (SS)	24.V.1992	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Protapion apricans</i> (Herbst, 1797)	Isola La Maddalena (SS)	21.V.1993	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Protapion dentipes</i> (Gerstächer, 1854)	Isola La Maddalena (SS)	27.V.1991	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Protapion difforme</i> (Germar, 1818)	Isola La Maddalena (SS)	21.V.1992	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Protapion nigrিতarse</i> (Kirby, 1808)	Isola di Sant'Antioco (CA), Sa Scrocca Manna	12.XII.1993	1 ex	leg. R. Poggi	Museo di Genova
<i>Protapion nigrিতarse</i> (Kirby, 1808)	Isola Caprera (SS)	13.XI.1993	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Protapion trifolii</i> (Linné, 1778)	Isola di Sant'Antioco (CA), Sa Scrocca Manna	12.XII.1993	*1 ex	leg. B. Colonna	Museo di Genova
<i>Phrissotrichum tubiferum</i> (Gyllenhal, 1833)	Isola Razzoli (SS), a sud del Faro	14.XII.1993	1ex	leg. R. Poggi	Museo di Genova
<i>Phrissotrichum tubiferum</i> (Gyllenhal, 1833)	Isola Caprera (SS)	2.VI.1991	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Phrissotrichum tubiferum</i> (Gyllenhal, 1833)	Isola Caprera (SS)	30.IV.1994	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Phrissotrichum tubiferum</i> (Gyllenhal, 1833)	Isola La Maddalena (SS)	4.III.1994	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna

Segue TABELLA III

<i>Perapion violaceum</i> (Kirby, 1808)	Isola La Maddalena (SS)	4.III.1994	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Ischnopterapion fallens</i> (Marseul, 1888)	Isola Caprera (SS)	25.V.1991	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Oxystoma pomonae</i> (Fabricius, 1798)	Isola Caprera (SS)	13.XI.1993	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Oxystoma pomonae</i> (Fabricius, 1798)	Isola Caprera (SS), Arbitucci	13.VI.1984	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Oxystoma pomonae</i> (Fabricius, 1798)	Isola Caprera (SS), P. Stefano	23.V.1987	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Oryxolaemus scabiosus</i> (Weise, 1889)	Isola La Maddalena (SS)	11.V.1992	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Oryxolaemus scabiosus</i> (Weise, 1889)	Isola La Maddalena (SS), Puntiglione	19.V.1990	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Eutrichapion vorax</i> (Herbst, 1797)	Isola Caprera (SS)	13.XI.1993	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
BRACHYCERIDAE					
<i>Brachycerus albidentatus</i> Gyllenhal, 1840	Isola La Maddalena (SS), Punta Abbatoggia	30.X.1986	2 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Brachycerus albidentatus</i> Gyllenhal, 1840	Isola Tavolata (SS)	9.V.1994	1 ex	leg. A. M. Zuppa	coll. B. Colonna
<i>Brachycerus barbarus</i> (Linné, 1758)	Isola Spargi (SS), Punta Zanotto	12.IV.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Brachycerus barbarus</i> (Linné, 1758)	Isola Spargi (SS), Punta Zanotto	3.III.1996	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Brachycerus barbarus</i> (Linné, 1758)	Isola Santa Maria (SS)	5.VI.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Brachycerus barbarus</i> (Linné, 1758)	Isola Tavolara (SS)	19.V.1994	1 ex	leg. A. M. Zuppa	coll. B. Colonna
<i>Brachycerus undatus undatus</i> (Fabricius, 1798)	Isola San Pietro (CA), Acquedotto	12.XII.1993	1 ex	leg. M. Galdieri	Museo di Genova
<i>Brachycerus undatus undatus</i> (Fabricius, 1798)	Isola La Maddalena (SS)	15.X.1991	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Brachycerus undatus undatus</i> (Fabricius, 1798)	Isola Santa Maria (SS)	13.IV.1991	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Brachycerus undatus undatus</i> (Fabricius, 1798)	Isola Caprera (SS), Candeo	28.III.1986	6 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Brachycerus undatus undatus</i> (Fabricius, 1798)	Isola Spargi (SS)	5.III.1986	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna

Segue TABELLA III

CURCULIONIDAE					
<i>Otiorhynchus aurifer</i> Boheman, 1843	Isola Spargi (SS), Punta Zanotto	12.IV.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Otiorhynchus cesaraccioi</i> Osella, Mammoli & Zuppa, 1991	Isola Razzoli (SS)	19.V.1991	3 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Otiorhynchus cribricollis</i> Gyllenhal, 1834	Isola La Maddalena (SS)	15.X.1991	3 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Otiorhynchus cribricollis</i> Gyllenhal, 1834	Isola Santa Maria (SS)	17.IV.1991	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Cathormiocerus curvipes</i> Wollaston, 1854	Isola La Maddalena (SS)	21.V.1992	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Trachyphloeus fusciscapus</i> Desbrochers, 1909	Isola La Maddalena (SS)	30.XII.1991	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Trachyphloeus fusciscapus</i> Desbrochers, 1909	Isola La Maddalena (SS)	10.XI.1993	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Trachyphloeus fusciscapus</i> Desbrochers, 1909	Isola La Maddalena (SS)	15.XI.1991	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Polydrusus parallelus</i> Chevrolat, 1860	Isola Caprera (SS), Casa Garibaldi	25.IV.1984	3 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Polydrusus parallelus</i> Chevrolat, 1860	Isola Caprera (SS)	26. IV.1991	4 exx	leg. G. Osella	coll. B. Colonna
<i>Pantomorus cervinus</i> Boheman, 1840	Isola Caprera (SS), P. Stefano	23.V.1987	2 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Pantomorus cervinus</i> Boheman, 1840	Isola La Maddalena (SS)	25.VIII.199 1	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Pantomorus cervinus</i> Boheman, 1840	Isola La Maddalena (SS)	15.V.1993	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sitona cambricus</i> Stephens, 1831	Isola La Maddalena (SS), Bacino idrico	9.V.1987	4 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Sitona cambricus</i> Stephens, 1831	Isola La Maddalena (SS)	25.X.1991	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sitona gemellatus</i> (Gyllenhal, 1834)	Isola Tavolara (SS)	19.V.1994	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sitona humeralis</i> (Stephens, 1831)	Isola Tavolara (SS)	13.V.1994	1 ex	leg. R. Poggi	Museo di Genova
<i>Sitona humeralis</i> (Stephens, 1831)	Isola di Sant’Antioco (SS), Sa Scrocca Manna	12.XII.1993	*1 ex	leg. R. Poggi	Museo di Genova

Segue TABELLA III

<i>Sitona humeralis</i> (Stephens, 1831)	Isola La Maddalena (SS)	21.V.1992	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sitona humeralis</i> (Stephens, 1831)	Isola La Maddalena (SS)	25.X.1991	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sitona intermedius</i> (Küster, 1847)	Isola di Sant’Antioco (CA), Sa Scrocca Manna	12.XII.1993	*1 ex	leg. R. Poggi	Museo di Genova
<i>Sitona lepidus</i> (Gyllenhal, 1832)	Isola La Maddalena (SS)	30.XII.1991	3 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sitona lepidus</i> (Gyllenhal, 1832)	Isola La Maddalena (SS)	21.V.1992	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sitona macularius</i> (Marsham, 1802)	Isola La Maddalena (SS)	25.X.1991	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Stephanocleonus tabidus</i> (Olivier, 1807)	Isola Caprera (SS)	13.IX.1991	3 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Pseudocleonus senilis</i> (Rosenhauer, 1856)	Isola La Maddalena (SS), Pontigliana	18.V.1990	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Lixomorphus algirus</i> (Linné, 1758)	Isola Santa Maria (SS)	5.VI.1984	3 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Lixomorphus algirus</i> (Linné, 1758)	Isola La Maddalena (SS), Padule	15.IV.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Lixomorphus algirus</i> (Linné, 1758)	Isola Santo Stefano (SS), Cala Villamarina	7.V.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Lixomorphus algirus</i> (Linné, 1758)	Isola Spargi (SS), Punta Zanotto	12.IV.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Lixomorphus algirus</i> (Linné, 1758)	Isola Caprera (SS), Arbitucci	13.VI.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Lixus anguinus</i> (Linné, 1767)	Isola Santa Maria (SS)	5.VI.1984	3 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Lixus junci</i> Boheman, 1836	Isola La Maddalena (SS), Moneta, Canale Fresi	18.V.1992	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Lixus punctiventris</i> Boheman, 1836	Isola Caprera (SS), Casa Garibaldi	25.IV.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Lixus punctiventris</i> Boheman, 1836	Isola La Maddalena (SS), Moneta	13.II.1986	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Lixus umbellatarum</i> (Fabricius, 1787)	Isola Caprera (SS), Casa Garibaldi	25.IV.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Lixus umbellatarum</i> (Fabricius, 1787)	Isola La Maddalena (SS), Abbatoggia	2.V.1987	2 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna

Segue TABELLA III

<i>Larinus genei</i> Boheman, 1907	Isola La Maddalena (SS)	6.IV.1993	2 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Larinus genei</i> Boheman, 1907	Isola Caprera (SS)		1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Rhytirrhinus</i> sp.	Isola San Pietro (CA)	11.VII.1993	*1 ex.	leg. R. Poggi	coll. G. Osella
<i>Gronops lunatus</i> (Fabricius, 1775	Isola La Maddalena (SS)	15.X.1993	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Gronops lunatus</i> (Fabricius, 1775	Isola La Maddalena (SS)	21.V.1992	*43 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Hypera arator</i> (Linné, 1758)	Isola La Maddalena (SS), Cala Francese	16.X.1986	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Hypera meles</i> (Fabricius, 1792)	Isola La Maddalena (SS)	4.III.1991	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Hypera nigrirostris</i> (Fabricius, 1775)	Isola La Maddalena (SS), Guardia Vecchia	15.IX.1990	*1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Hypera postica</i> (Gyllenhal, 1813)	Isola La Maddalena (SS)	25.X.1991	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Donus crinitus</i> (Boheman, 1834)	Isola Caprera (SS), Casa Garibaldi	25.IV.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Donus crinitus</i> (Boheman, 1834)	Isola Tavolara (SS)	19.V.1994	1 ex	leg. A. M. Zuppa	coll. B. Colonna
<i>Donus philanthus</i> (Olivier, 1808)	Isola Caprera (SS), Casa Garibaldi	25.IV.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Donus philanthus</i> (Olivier, 1808)	Isola Santo Stefano (SS)	7.IV.1984	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Rhytideres plicatus</i> (Olivier, 1790)	Isola La Maddalena (SS)	15.X.1991	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Rhytideres plicatus</i> (Olivier, 1790)	Isola La Maddalena (SS), Moneta	13.II.1986	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Anisorhynchus costatus</i> Boheman, 1842	Isola Caprera (SS), Cala Portasa	21.III.1990	*1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Styphloderes exculptus</i> (Boheman, 1843)	Isola Santa Maria (SS)	18.V.1991	*17 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Styphloderes exculptus</i> (Boheman, 1843)	Isola La Maddalena (SS), Cala Inferno	12.XI.1986	30 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Styphloderes exculptus</i> (Boheman, 1843)	Isola La Maddalena (SS), Moneta	3.IV.1991	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna

Segue TABELLA III

<i>Styphloderes exculptus</i> (Boheman, 1843)	Isola Caprera (SS)	25.IV.1984	10 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Styphloderes exculptus</i> (Boheman, 1843)	Isola Caprera (SS), Cala Napoleone	21.XII.1985	30 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Mesites pallidipennis</i> (Boheman, 1837)	Isola Santa Maria (SS)	30.V.1993	*4 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Pselactus spadix</i> (Herbst, 1795)	Isola Santa Maria (SS)	18.V.1991	9 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Pselactus spadix</i> (Herbst, 1795)	Isola Santa Maria (SS)	30.V.1993	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Pselactus spadix</i> (Herbst, 1795)	Isola La Maddalena (SS), Cala Inferno	12.XI.1986	18 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Pselactus spadix</i> (Herbst, 1795)	Isola La Maddalena (SS), Cala Inferno	28.IV.1990	6 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Pselactus spadix</i> (Herbst, 1795)	Isola Caprera (SS), Cala Napoletana	21.XII.1985	3 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Pselactus spadix</i> (Herbst, 1795)	Isola Caprera (SS), Stagnali	3.XI.1986	6 exx	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Hadroplonthus trimaculatus</i> (Fabricius, 1775)	Isola La Maddalena (SS), Nido d'Aquila	10.XI.1986	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Derelomus subcostatus</i> (Boheman, 1844)	Isola La Maddalena (SS)	16.VII.1990	2 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal, 1836)	Isola La Maddalena (SS), Cala Chiesa	16.X.1991	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna
<i>Sibinia attalica</i> Gyllenhal, 1836	Isola Santo Stefano (SS), Cala Villamarina	17.VI.1989	*3 exx	leg. G. Osella	coll. B. Colonna
<i>Sibinia attalica</i> Gyllenhal, 1836	Isola La Maddalena (SS)	5.IV.1990	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sibinia attalica</i> Gyllenhal, 1836	Isola La Maddalena (SS)	21.V.1992	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sibinia attalica</i> Gyllenhal, 1836	Isola La Maddalena (SS)	25.X.1991	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sibinia attalica</i> Gyllenhal, 1836	Isola La Maddalena (SS)	25.X.1992	*2 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sibinia attalica</i> Gyllenhal, 1836	Isola La Maddalena (SS)	23.V.1993	*3 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sibinia variata</i> Gyllenhal, 1836	Isola La Maddalena (SS)	27.II.1992	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna

Segue TABELLA III

<i>Sibinia variata</i> Gyllenhal, 1836	Isola La Maddalena (SS)	21.V.1992	*7 exx	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Procas cottyi</i> Perris, 1864	Isola Spargi (SS), Valle di Cala Canniccio	13.XII.1993	1 ex	leg. R. Poggi	Museo di Genova
<i>Mecinus comosus</i> Boheman, 1845	Isola La Maddalena (SS), Arsenale	4.III.1994	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Mecinus comosus</i> Boheman, 1845	Isola La Maddalena (SS), Arsenale	10.III.1994	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Mecinus comosus</i> Boheman, 1845	Isola La Maddalena (SS), Arsenale	13.III.1994	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Mecinus longiusculus</i> Boheman, 1845	Isola La Maddalena (SS)	13.III.1992	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Mecinus pyraister</i> (Herbst, 1795)	Isola La Maddalena (SS)	10.III.1994	*1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
RHYNCHOPHORIDAE					
<i>Sphenophorus abbreviatus</i> (Fabricius, 1787)	Isola Caprera (SS)	22.V.1992	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sphenophorus abbreviatus</i> (Fabricius, 1787)	Isola Caprera (SS)	28.V.1992	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sphenophorus abbreviatus</i> (Fabricius, 1787)	Isola La Maddalena (SS)	21.III.1993	1 ex	leg. B. Colonna	coll. B. Colonna
<i>Sphenophorus striatopunctatus</i> (Goeze, 1777)	Isola La Maddalena (SS), G. Turco	2.V.1987	1 ex	leg. G. Cesaraccio	coll. B. Colonna

BREVI OSSERVAZIONI SU DUE SPECIE SIGNIFICATIVE DELLE ISOLE PARASARDE

Nel presente lavoro le nuove segnalazioni relative ai Coleoptera Curculionoidea delle isole succitate riguardano complessivamente 75 specie di cui 65 per le isole parasarde e 10 per le isole del canale di Sicilia. Di queste 24 risultano inedite per almeno un’isola del primo gruppo e 4 per quelle del secondo gruppo. Oltre alla nuova specie di *Otiorhynchus* dell’isola di Lampione meritano un breve commento due delle segnalazioni qui riportate: *Rhytirrhinus* sp. e *Procas cottyi* Perris, 1864 (Tabella III). *Rhytirrhinus* è inedito, come genere, per la fauna italiana. La determinazione specifica, tuttavia, non è attualmente possibile senza lo studio critico di tutte le entità iberomaghrebine affini. Occorre sottolineare, poi, che ai *Rhytirrhinus* appartengono, secondo Meregalli (in litteris), esclusivamente le specie sud africane del Cata-

logo Junk (SCHENKLING & MARSHALL, 1929); per quelle paleartiche sarà necessario, invece, utilizzare uno dei sinonimi che ingombrano la letteratura entomologica.

Procas cottyi, invece, è un'entità di recente entrata a far parte della fauna italiana, essendo stata segnalata per l'isola di Pantelleria (OSELLA & RITI, 1995). Il suo rinvenimento anche all'isola di Spargi, pertanto, rappresenta un significativo ampliamento dell'areale del taxon, sino a pochi anni addietro considerato elemento esclusivo maghrebino. Sono da attribuirsi altresì a *P. cottyi* gli esemplari di *Procas armillatus* dell'isola della Maddalena così citati da GREGORI & OSELLA (1989).

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo l'amico dr. R. Poggi per averci affidato in studio questi preziosi materiali; ringraziamo altresì il sig. Bruno Colonna per averci permesso di studiare i suoi Curculionoidea sardi raccolti soprattutto nell'Arcipelago della Maddalena.

BIBLIOGRAFIA

- GREGORI L. & OSELLA G., 1989 - Ricerche zoologiche della nave oceanografica "Minerva" (C.N.R.) sulle isole circumsarde. VI. Il popolamento a Coleotteri Curculionoidea (Insecta) - *Annali Mus. civ. St. nat. G. Doria*, Genova, 87:373-492.
- MAGNANO L., 1992 - Note sugli *Otiorhynchus* del subgen. *Arammichnus*. 2. Le specie dei gruppi di *O. proximophthalmus*, *cribricollis*, *striatosetosus* e *sulcirostris* (Coleoptera, Curculionidae) - *Fragmenta entom.*, Roma, 24: 99-130.
- O'BRIEN C. W. & ASKEVOLD I., 1992 - Systematics and Evolution of Weevils of the Genus *Bagous* Germar (Coleoptera: Curculionidae). I. Species of Australia - *Trans. amer. entom. Soc.*, Philadelphia, 118 (4): 331-452.
- OSELLA G. & ZUPPA A.M., 1995 - I Curculionoidea (Coleoptera) della Sardegna ed isole circumsarde: preliminare analisi zoogeografica - *Biogeographia*, Bologna, 18: 507-522.
- OSELLA G. & RITI M., 1995 - Coleoptera Attelabidae, Apionidae, Brachyceridae e Curculionidae- In: Arthropoda di Lampedusa, Linosa e Pantelleria (Canale di Sicilia, Mar Mediterraneo) - *Naturalista sicil.*, Palermo, 19 (suppl.): 597-665.
- PIEROTTI H. & BELLO' C., 2000 - Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini paleartici. III. Revisione del genere *Dolichomeira* Solari, 1954 (Coleoptera Curculionidae Polydrosinae) - *Boll. Mus. civ. St. nat. Verona*, 24: 129-192.
- SCHENKLING S. & MARSHALL G.A.K., 1929 - Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk editus a S. Schenkling. Pars 106. Curculionidae: Byrsopinae, Rhytirrhinae, Thecesterninae, Hipporrhinae, Rhyparosominae - Ed. W. Junk, Berlin: 3-62.

RIASSUNTO

Viene descritto *Otiorhynchus (Arammichnus) poggii* n. sp. dell'isola di Lampione (Sicilia, Pelagie). La nuova specie è sistematicamente vicina soprattutto ad *O. reticollis* di Sicilia, da cui si differenzia per la forma e dimensione degli occhi, per la vestitura del pronoto e delle elitre e per la struttura delle armature genitali. Nella Tabella I sono riportati i caratteri distintivi che maggiormente caratterizzano la nuova specie rispetto alle specie più affini. Nelle Tabelle II e III vengono inoltre riportati i nuovi dati faunistici, relativi ai Coleoptera Curculionoidea delle isole del canale di Sicilia e delle isole parasarde, successivi ai lavori di GREGORI & OSELLA (1989) e OSELLA & RITI (1995).

ABSTRACT

Otiorhynchus (Arammichnus) poggii n. sp. from Lampione island (Sicily) is here diagnosed. The new taxon belongs to the *O. cribricollis* group (sensu MAGNANO 1992) and seems more strictly related to *O. reticollis* (Sicily) from which it is easily distinguishable by shape and size of eyes, pubescence of pronotum and genital structures. In Tab. I morphological comparative characters of new and more related species of *O. cribricollis* group are reported. In Tab. II and Tab. III new faunistical data about Coleoptera Curculionoidea from Sicilian and Sardinian islands, following GREGORI & OSELLA (1989) and OSELLA & RITI (1995), are given.

